

伊東市の予防接種

令和2年10月1日現在

【お問い合わせ】 伊東市健康推進課 予防接種担当 ☎0557-32-1584

ワクチンの種類		接種回数		公費助成で接種できる年齢	標準的な接種時期	接種間隔	備考	通知送付時期	
不活化	ヒブ	1~4回	初回 1回目 2回目 3回目 追加	生後2か月~5歳に至るまで	生後2か月~7か月に至るまでに初回1回目を接種		接種開始時期によって接種回数と接種間隔が異なります。詳細は「ヒブワクチン接種フローチャート」をご確認ください。	出生届の時窓口で手渡し	
不活化	小児用肺炎球菌	1~4回	初回 1回目 2回目 3回目 追加	生後2か月~5歳に至るまで	生後2か月~7か月に至るまでに初回1回目を接種		接種開始時期によって接種回数と接種間隔が異なります。詳細は「小児用肺炎球菌ワクチン接種フローチャート」をご確認ください。		
生(注射)	BCG	1回		1歳に至るまで	生後5か月~8か月に至るまで				
不活化	B型肝炎	3回	1回目 2回目 3回目	1歳に至るまで	生後2か月~9か月に至るまで	27日以上 1回目から139日以上	• HBs抗原陽性の母親から生まれ、健康保険によりB型肝炎ワクチンを接種した方は、公費負担の対象外となります。		
生(経口)	ロタウイルス	ロタリックス(1価) 2回 ロタテック(5価) 3回	1回目 2回目 1回目 2回目 3回目	生後6週~24週 生後6週~32週	生後2か月~14週6日までに1回目を接種	27日以上	• 生後15週以降の初回接種は、腸重積症の好発年齢と重なるためお勧めしていません。 • 原則として、途中からワクチンの変更はせず、最初に接種したワクチンを続けて接種してください。		
不活化	四種混合	ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	4回 1期初回 1回目 2回目 3回目 1期追加	生後3か月~7歳半に至るまで	生後3か月~1歳に至るまで 初回3回目接種後1年~1年半に至るまで	20日以上 (標準的には20~56日) 初回3回目接種後6か月以上			
不活化	二種混合		ジフテリア 破傷風	1回 2期	11歳以上13歳未満	11歳~12歳に至るまで			• 四種混合の2期に当たります。
生(注射)	麻しん風しん混合	2回	1期 2期	1歳~2歳に至るまで 小学校就学前1年間					1歳になる前月末 6歳になる年度の前年度末
生(注射)	水痘	2回	1回目 2回目	1歳~3歳に至るまで	生後12か月~15か月に至るまで 1回目接種後6か月~12か月に至るまで	3か月以上	• すでに水痘にかかったことがある方は、公費負担の対象外となります。		1歳になる前月末
不活化	日本脳炎	4回	1期初回 1回目 2回目 1期追加 2期	生後6か月~7歳半に至るまで 9歳以上13歳未満	3歳~4歳に至るまで 初回2回目終了後おおむね1年後 9歳~10歳に至るまで	6日以上 (標準的には6~28日) 初回2回目接種後6か月以上	• 平成19年4月1日以前に生まれた方は、1期と2期の不足分を20歳になる前日まで公費で接種することができます。 • 平成19年4月2日~平成21年10月1日の間に生まれた方は、1期の不足分を9歳~13歳未満の間に公費で接種することができます。		3歳になる前月末 9歳になる前月末
不活化	子宮頸がん ※女性のみ		サーバリックス(2価) 3回 ガーダシル(4価) 3回	12歳になる年度の初日から16歳になる年度の末日まで(小学6年生~高校1年生相当)	平成25年6月以降、積極的な勧奨を差し控えています。接種を希望する方には接種内容の詳細を送付しますので、健康推進課までご連絡ください。				

★異なる種類のワクチンの接種間隔：注射生ワクチン接種後は他の注射生ワクチン接種まで27日以上あけてください。同時接種は医師が認める場合は可能です。

★市外での接種を希望する方には依頼書を発行します。接種予定日の1週間以上前に健康推進課へご連絡ください。